



## Effect of considering nutrient equivalency of a multi enzyme with $\beta$ -mannanase in feed formulation on broiler chicks' performance

Elham Darsi<sup>1</sup> | Mojtaba Zhaghari<sup>2</sup> | Jafar Shadman<sup>3</sup>

1. Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Recourse, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: [elhamdarsi@ut.ac.ir](mailto:elhamdarsi@ut.ac.ir)
2. Corresponding Author, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Recourse, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: [mzaghari@ut.ac.ir](mailto:mzaghari@ut.ac.ir)
3. Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Recourse, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: [jafarshadman@ut.ac.ir](mailto:jafarshadman@ut.ac.ir)

---

**Article Info****ABSTRACT****Article type:**

Research Article

**Article history:**

Received: February 29, 2020

Received in revised form:

November 2, 2020

Accepted: November 4, 2020

Published online: April 15, 2023

**Keywords:**

$\beta$ -Mannanase,  
broiler chick,  
multi enzyme,  
nutrient equivalency,  
performance.

The aim of this study was to determine the response of the Ross 308 broilers to  $\beta$ -mannanase containing multi-enzyme with different percentages of nutrient equivalency values of multi-enzyme in corn-soybean based dies. A total of 192 male Ross 308 broiler chicks were used in a completely randomized design with six treatments, eight replicates, and four birds in each. Treatment one (positive control) was a normal corn-soybean meal diet without multi-enzymes. Treatments two, three, four, and five contained 0.3 kg/ton multi enzymes, using 25, 50, 75, and 100% of the nutrients equivalency value of enzyme, respectively. The sixth treatment (negative control) was like to fifth treatment but without added multi-enzyme. Body weight gain and feed conversion ratio (FCR) were assessed weekly. The results indicate, no significant difference among the treatment one and two in body weight gain and FCR. At 42 days of age, the difference in body weight of the negative control group and treatment five was significant ( $P<0.0001$ ). The similar performance of birds in treatment two despite lower metabolized energy, crude protein, and phosphorus with added enzyme, comparing to the positive control group, indicating that multi-enzyme had the potential for releasing the feed nutrients.

---

**Cite this article:** Darsi, E., Zhaghari, M., & Shadman, J. (2023). Effect of considering nutrient equivalency of a multi enzyme with  $\beta$ -mannanase in feed formulation on broiler chicks' performance. *Iranian Journal of Animal Science*, 54 (1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.22059/ijas.2020.298520.653772>



© The Author(s).

DOI: <https://doi.org/10.22059/ijas.2020.298520.653772>

Publisher: University of Tehran Press.

---

**Extended Abstract****Introduction**

Soybean meal is a common source of protein in poultry feed, however, it contains a number of anti-nutritional factors, including non-starch polysaccharides. Non-starch polysaccharides are among the factors that reduce the availability of



nutrients. Enzymes improve the digestibility of feed nutrients either directly or by eliminating non-nutritional factors, and their use in poultry diets has become common since the last four decades. Therefore, the aim of this study was to investigate the response of Ross 308 broiler chickens to thirteen multi-enzymes containing beta-mannanase, taking into account the different levels of nutrients equivalent to the enzyme in the diet based on corn and soybean meal.

### **Materials and Methods**

In order to investigate the response of broiler chickens to thirteen multi-enzymes containing beta-mannanase, an experiment was carried out in the form of a completely randomized design with 6 treatments in 8 replications and 48 experimental units in which there were 4 Ross 308 chickens in each unit, and in total with 192 chickens were used. Treatments 2, 3, 4 and 5 contained 0.3 kg per ton of thirteen multi-enzymes, which were 25, 50, 75 and 100% equivalent of enzyme nutrients respectively in setting the formulas. Treatment 6 (negative control) was similar to treatment 5 but without using multi-enzyme. Chickens at the ages of 7, 14, 21, 35 and 42 were weighed and the feed conversion factor was calculated. At the end of the experiment period. Excreta samples of each cage were collected to measure the amount of calcium, phosphorus and nitrogen. The amount of calcium and phosphorus was measured with an atomic absorption device and a spectrophotometer, respectively, based on the method proposed by the Official Analytical Association of American Chemists.

### **Results**

The highest body weight and the best feed conversion ratio at the ages of 7, 14, 21, and 28 days were obtained by consuming a diet containing multi-enzyme and calculating 25% equivalent of its nutrients, and the lowest performance was related to the chickens that received the negative control feed ( $P<0.0001$ ). At the end of the experimental period, the difference in weight and feed conversion efficiency of treatment one and two was not significant. The difference in body weight between the negative control group and treatment 5 at the age of 42 days was significant ( $P<0.0001$ ). Adding multi-enzyme to the diet did not have a significant effect on the amount of calcium excretion through feces. Based on the obtained results, the excretion of phosphorus in the chickens that consumed the enzyme was 3.6% lower than the other two groups that did not consume the enzyme (positive and negative control groups), which indicates more absorption of phosphorus from the digestive system. Furthermore, Enzyme addition reduced nitrogen excretion through excreta.

### **Conclusion**

The same performance of chickens fed with treatment two, despite the reduction in the amount of metabolizable energy, crude protein and available phosphorus, with the addition of enzyme compared to the positive control treatment, indicates the potential of nutrient release by multienzyme.

**Keywords:**  $\beta$ -Mannanase, broiler chick, multi enzyme, nutrient equivalency, performance,



## اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی آنژیم حاوی بتا-ماناناز در جیره غذایی بر عملکرد جوچه‌های گوشتی

الهام دارسی آرانی<sup>۱</sup> | مجتبی زاغری<sup>۲</sup> | جعفر شادمان<sup>۳</sup>

۱. گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران، رایانامه: [elhamdarsi@ut.ac.ir](mailto:elhamdarsi@ut.ac.ir)  
۲. نویسنده مسئول، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران، رایانامه: [mzaghari@ut.ac.ir](mailto:mzaghari@ut.ac.ir)  
۳. گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران، رایانامه: [jafarshadman@ut.ac.ir](mailto:jafarshadman@ut.ac.ir)

اطلاعات مقاله	چکیده	نوع مقاله: مقاله پژوهشی
<p>هدف این پژوهش بررسی پاسخ جوچه‌های گوشتی راس ۳۰۸ به مولتی آنژیم سیزده‌گانه حاوی بتا ماناناز با احتساب سطوح مختلف مواد مغذی معادل آنژیم در جیره بر پایه ذرت- سویا بود. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با ۶ تیمار، ۸ تکرار و ۴ پرنده در هر تکرار و با استفاده از ۱۹۲ قطعه جوجه خروس سویه راس ۳۰۸ انجام شد. تیمار یک (کنترل مثبت) بدون استفاده از مولتی آنژیم سیزده‌گانه تنظیم شد. تیمارهای ۲، ۳، ۴ و ۵ <math>\frac{1}{3}</math> کیلوگرم در تن مولتی آنژیم سیزده‌گانه بود که به ترتیب ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد معادل مواد مغذی آنژیم در تنظیم فرمول‌ها لحاظ گردید. تیمار شش (کنترل منفی) مشابه تیمار ۵ و بدون استفاده از مولتی آنژیم بود. صفات افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک هر هفت‌هه اندازه‌گیری شد. در پایان دوره آزمایش تفاوت وزن و ضریب تبدیل تیمار یک و دو معنی‌دار نبود. تفاوت وزن بدن گروه کنترل منفی و تیمار ۵ در سن ۴۲ روزگی معنی‌دار بود (<math>P &lt; 0.001</math>). عملکرد یکسان جوچه‌های تغذیه‌شده با تیمار دو، با وجود کاهش مقدار انرژی قبل سوخت و ساز، پروتئین خام و فسفر قابل دسترس، با افزودن آنژیم در مقایسه با تیمار کنترل مثبت، بیانگر پتانسیل آزاد سازی مواد مغذی توسط مولتی آنژیم است.</p> <p>کلیدواژه‌ها: بتا-ماناناز، جوچه گوشتی، عملکرد، مواد مغذی معادل، مولتی آنژیم.</p>	<p>هندسه این پژوهش بررسی پاسخ جوچه‌های گوشتی راس ۳۰۸ به مولتی آنژیم سیزده‌گانه حاوی بتا ماناناز با احتساب سطوح مختلف مواد مغذی معادل آنژیم در جیره بر پایه ذرت- سویا بود. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با ۶ تیمار، ۸ تکرار و ۴ پرنده در هر تکرار و با استفاده از ۱۹۲ قطعه جوجه خروس سویه راس ۳۰۸ انجام شد. تیمار یک (کنترل مثبت) بدون استفاده از مولتی آنژیم سیزده‌گانه تنظیم شد. تیمارهای ۲، ۳، ۴ و ۵ <math>\frac{1}{3}</math> کیلوگرم در تن مولتی آنژیم سیزده‌گانه بود که به ترتیب ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد معادل مواد مغذی آنژیم در تنظیم فرمول‌ها لحاظ گردید. تیمار شش (کنترل منفی) مشابه تیمار ۵ و بدون استفاده از مولتی آنژیم بود. صفات افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک هر هفت‌هه اندازه‌گیری شد. در پایان دوره آزمایش تفاوت وزن و ضریب تبدیل تیمار یک و دو معنی‌دار نبود. تفاوت وزن بدن گروه کنترل منفی و تیمار ۵ در سن ۴۲ روزگی معنی‌دار بود (<math>P &lt; 0.001</math>). عملکرد یکسان جوچه‌های تغذیه‌شده با تیمار دو، با وجود کاهش مقدار انرژی قبل سوخت و ساز، پروتئین خام و فسفر قابل دسترس، با افزودن آنژیم در مقایسه با تیمار کنترل مثبت، بیانگر پتانسیل آزاد سازی مواد مغذی توسط مولتی آنژیم است.</p> <p>کلیدواژه‌ها: بتا-ماناناز، جوچه گوشتی، عملکرد، مواد مغذی معادل، مولتی آنژیم.</p>	<p>تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰</p> <p>تاریخ بازنگری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲</p> <p>تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴</p> <p>تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶</p>

استناد: دارسی آرانی، ا.، زاغری، م.، و شادمان، ج. (۱۴۰۲). اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی آنژیم حاوی بتا-ماناناز در جیره غذایی بر عملکرد جوچه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی ایران، ۵۴ (۱)، ۱۲-۱. DOI: <https://doi.org/10.22059/ijas.2020.298520.653772>



© نویسنده‌ان

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

## ۱. مقدمه

استفاده از آنژیم‌ها برای بالا بردن قابلیت دسترسی مواد مغذی در جیره حیوانات از سال ۱۹۲۵ گزارش شده است، اما استفاده تجاری از آنژیم‌ها به عنوان افزودنی‌های غذایی تاریخچه چهل ساله دارد. جیره طیور به طور عمده بر پایه ذرت و سویا می‌باشد که منبع اصلی انرژی و پروتئین جیره هستند. ذرت در جیره طیور به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شود و مواد مغذی موجود در آن در سطح بالایی توسط طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد. سویا نیز یک منبع مرسوم پروتئینی در جیره طیور است اما تعدادی از فاکتورهای ضدتعذیه‌ای از جمله پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای در آن وجود دارد. پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته از جمله فاکتورهایی هستند که میزان دسترسی مواد مغذی را کاهش می‌دهند. ۷٪ ۲۲٪ کربوهیدرات‌های موجود در کنجاله سویا به صورت پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای هستند. مانان‌ها از جمله این پلی‌ساقاریدها هستند که متابولیسم گلوکز و ترشح انسولین را در خوک‌ها تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه میزان جذب و استفاده از گلوکز و آمینواسیدها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و منجر به کاهش رشد و بهره‌وری خوارک می‌شوند (Jackson *et al.*, 1999).

شناسایی و حذف مواد غذایی (ضد تعذیه‌ای) که مانع استفاده از مواد مغذی می‌شوند برای رشد و تولید مناسب طیور ضروری است.

آنژیم‌ها قابلیت هضم مواد مغذی خوارک را یا به طور مستقیم و یا از طریق از بین بردن فاکتورهای غیرتعذیه‌ای بهبود می‌دهند (Bedford, 2018) و استفاده از آنها در جیره طیور از چهار دهه گذشته متداول شده است. فیتاژها، پروتئازها و پلی‌ساقاریدازهای غیرنشاسته‌ای انواعی از آنژیم‌ها هستند که در صنعت خوارک طیور مورد استفاده قرار می‌گیرند و علاوه بر بهبود قابلیت هضم مواد غذایی، میزان جذب و استفاده از آنها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند (Pirgozliev *et al.*, 2011; Cowieson *et al.*, 2009; Cowieson and Bedford, 2009). آنژیم‌ها به مقدار کم در جیره استفاده می‌شوند اما اثر قابل توجهی دارند و در نتیجه مقدار مواد مغذی آنها بالا است. مقدار مواد مغذی که در نتیجه فعالیت آنژیم‌ها آزاد شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان مواد مغذی معادل آنژیم (Matrix) شناخته می‌شود و انواع مختلف آنژیم‌ها باعث آزاد شدن انواع مختلفی از مواد مغذی در مقادیر متفاوت می‌شوند برای مثال پلی‌ساقاریدازهای غیرنشاسته‌ای باعث آزاد سازی انرژی، آمینواسیدها و پروتئین‌ها می‌شوند (Bedford and Cowieson, 2020). نتایج مطالعات مختلف نشان داد استفاده از این آنژیم‌ها در جیره طیور منجر به بهبود میزان دسترسی مواد مغذی و در نتیجه عملکرد طیور شده است (Cowan *et al.*, 1996; Berwanger *et al.*, 2017). به طور کلی استفاده از مواد مغذی معادل آنژیم در هنگام فرمولاسیون جیره می‌تواند میزان استفاده از مواد غذایی مرتبط با آنژیم و در نتیجه قیمت نهایی جیره را کاهش داده و عملکرد پرنده را بهبود دهد.

در بیشتر مطالعات انجام شده آنژیم به صورت سرک به جیره اضافه شده است اما جهت بهره‌مندی از مزایای افزودن آنژیم به خوارک بهتر است مواد مغذی معادل آنها در هنگام فرموله کردن جیره‌ها در نظر گرفته شود (Cowieson *et al.*, 2010; Rosen, 2001; 2002; Yi *et al.*, 1996; Ravindran *et al.*, 2001; Zaghari *et al.*, 2008; Cowieson *et al.*, 2001) و بر اساس تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران، معادل انرژی، فسفر، پروتئین و آمینواسیدهای مولتی آنژیم استفاده شده در این تحقیق تعیین و توسط شرکت تولیدکننده این مولتی آنژیم ارائه شد.

با توجه به اینکه قابلیت هضم پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای بسیار پایین بوده و مقدار زیادی از آنها از طریق فضولات دفع می‌شوند و این پلی‌ساقاریدها با مقادیر زیادی آب ترکیب شده و در نتیجه چسبندگی را افزایش می‌دهند و این چسبندگی قابلیت هضم کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، آنژیم ماناناز به ترکیب مولتی

آنژیم تجاری ناتوزیم اضافه شد. بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده و با توجه به اضافه شدن آنژیم ماناناز به مولتی آنژیم تجاری ناتوزیم، در پژوهش حاضر اثر حضور آنژیم ماناناز در شرایط استفاده از معادل مواد مغذی آنژیم، بر عملکرد جوجه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

## ۲. مواد و روش‌ها

آزمایش در آزمایشگاه تحقیقات بیولوژی طیور گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. به منظور بررسی پاسخ جوجه‌های گوشتی به مولتی آنژیم سیزده‌گانه حاوی بتا ماناناز، آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار در ۸ تکرار و ۴۸ واحد آزمایشی که در هر واحد ۴ قطعه جوجه خروس راس ۳۰۸ قرار داشتند، انجام شد. بنابراین در مجموع ۱۹۲ قطعه جوجه یک روزه مورد استفاده قرار گرفت. در کل دوره شش جیره آزمایشی برای دوره‌های آغازین، رشد و پایانی فرموله شد. تیمار یک (کنترل مثبت) خوراک بر پایه ذرت و سویا بود و مواد مغذی محتوی آن در مراحل آغازین، رشد و پایانی بر اساس پیشنهاد راهنمای تعذیب سویه راس ۳۰۸ (سال ۲۰۱۴)، بدون استفاده از مولتی آنژیم سیزده‌گانه و بدون اعمال ماتریس مولتی آنژیم تنظیم شد. در تیمارهای ۲، ۳، ۴ و ۵، خوراک حاوی ۰/۳ کیلوگرم در تن مولتی آنژیم سیزده‌گانه بود که به ترتیب ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد از ارزش معادل مواد مغذی آنژیم (جدول ۱) در تنظیم فرمول‌ها لحاظ گردید و تیمار شش (کنترل منفی) از لحاظ نسبت اقلام جیره مشابه تیمار ۵ بود با این تفاوت که به جای مولتی آنژیم از پرکننده (ماسه بادی) استفاده گردید (جدول‌های ۲، ۳ و ۴). به منظور حذف اثر افزایش مصرف خوراک (با رقیق شدن جیره‌ها از تیمار دو تا شش) مقدار خوراک مصرفی جوجه‌ها در کلیه تیمارها محدود و به اندازه مصرف تیمار آخر (کنترل منفی) یعنی رقیق‌ترین جیره تنظیم و روزانه در دفعات متعدد در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت.

جوجه‌ها در سنین ۷، ۱۴، ۲۱، ۳۵ و ۴۲ توزین و ضریب تبدیل خوراک به وزن زنده محاسبه گردید (جدول ۵). در پایان دوره آزمایش، نمونه فضولات هر قفس برای اندازه‌گیری میزان کلسیم، فسفر و ازت فضولات جمع‌آوری شد (جدول ۶). مقدار کلسیم و فسفر به ترتیب با دستگاه جذب اتمی و اسپکتوفوتومتر و روش پیشنهادی انجمن تحلیلی رسمی شیمی‌دانان امریکا (ANOVA) اندازه‌گیری شد. خاکستر نا محلول در اسید با استفاده از کوره و روش معمول اندازه‌گیری شد (Siriwan *et al.*, 1993). داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS 9.0 (2011) روش GLM مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقایسه تفاوت میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت.

## ۳. نتایج و بحث

نتایج مربوط به افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌ها در سنین مختلف در جدول ۵، آورده شده است. بالاترین وزن بدن و بهترین ضریب تبدیل خوراک در سنین ۱۴، ۲۱ و ۴۲ روزگی با مصرف جیره حاوی مولتی آنژیم و محاسبه ۲۵ درصد معادل مواد مغذی آن حاصل شد و پایین‌ترین عملکرد مربوط به جوجه‌هایی بود که خوراک کنترل منفی را دریافت نموده بودند ( $P<0.0001$ ). در کل دوره آزمایش تفاوت وزن و ضریب تبدیل تیمار یک و دو معنی‌دار نبود ( $P<0.0001$ ). تفاوت وزن بدن گروه کنترل منفی و تیمار ۵ (محاسبه ۱۰۰ درصد مواد مغذی معادل آنژیم) در سن ۴۲ روزگی معنی‌دار بود ( $P<0.0001$ ).

جدول ۱. مواد مغذی معادل یک کیلوگرم مولتی آنزیم (توصیه شده توسط شرکت تولید کننده)

(kcal/kg)	۴۴۲۸۵۷	AMEn (kcal/kg)
%	۲۱۴۳	CP
%	۴۰۰	Ca
%	۳۷۱	P
%	۳۴	Lys
%	۳	Met
%	۱۲	Met+Cys
%	۳۷	Thr

ترکیبات مولتی آنزیم (واحد/گرم): فیتاز ۱۵۰۰، بنا گلوکاناز ۷۰۰، الفاامیلاز ۷۰۰، سولراز ۴۰۰۰، پکتیناز ۷۰، زایلاناز ۱۰۰۰۰، لیپاز ۳۰، پروتئاز ۳۰۰۰، بنا ماناناز ۶۰۰.  
Multienzyme compounds(per gram): phytase1500, ßglucanase700,  $\alpha$ amylase700,cellolase6000, pektinase70,xylanase10000, lypase30, protease3000, mannanase600

جدول ۲. ترکیب مواد خواراکی و مواد مغذی خوراک‌های آزمایشی دوره آغازین (۰ تا ۱۰ روزگی)

Ingredients	Diets					
	C <sup>+</sup>	%NMV <sup>۲۵</sup>	%NMV <sup>۵۰</sup>	%NMV <sup>۷۵</sup>	%NMV <sup>۱۰۰</sup>	C <sup>-</sup>
Corn grain	۴۹۳/۳	۵۰.۸/۷	۵۲۴/۷	۵۴۰/۷	۵۵۹/۷	۵۵۶/۷
Soybean meal	۴۲۳	۳۴۱۶	۶۴۰۹	۸۴۰۲	۳۹۶	۳۹۶
Corn oil	۱/۴۱	۱/۳۳	۲۵	۸/۱۶	۷/۸	۷/۸
Dicalcium phosphate	۶/۱۸	۱۷	۴/۱۵	۸/۱۳	۲/۱۲	۲/۱۲
Oyster shell	۶/۹	۸/۹	۱/۱۰	۳/۱۰	۶/۱۰	۶/۱۰
Common Salt	۴/۵	۳/۴	۱/۴	۹/۳	۷/۳	۷/۳
Sodium bicarbonate	۳/۰	۶/۰	۹/۰	۱/۱	۴/۱	۱/۴
Vitamin and Min. premix <sup>۲</sup>	۵	۵	۵	۵	۵	۵
DL-Methionine	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۲/۳	۲/۳	۲/۳
L-Lysine HCl	۸/۰	۹/۰	۱/۱	۱/۲	۴/۱	۴/۱
L-Threonine	۶/۰	۷/۰	۷/۰	۷/۰	۸/۰	۸/۰
Multi enzyme	•	۳/۰	۳/۰	۳/۰	۳/۰	•
Filler	•	•	•	•	•	۳/۰
Sum	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
Nutrients (Calculated as %)						
ME <sub>n</sub> (kcal/kg)	۲۹۵۰	۲۹۱۶	۲۸۸۳	۲۸۵۰	۲۸۱۷	۱۴/۲۸۱۷
Crude protein	۶۱۶/۲۲	۴۵۵/۲۲	۲۹۴/۲۲	۱۳۳/۲۲	۹۷۳/۲۱	۹۷۳/۲۱
Calcium	۹۴۴/۰	۹۱۲/۰	۸۸۴/۰	۸۵۴/۰	۰۸۲۴	۸۲۴/۰
Available phosphorus	۴۷۲/۰	۴۴۴/۰	۴۱۶/۰	۳۸۸/۰	۳۶۰/۰	۳۶۱/۰
Na	۲/۰	۲/۰	۲/۰	۲/۰	۲/۰	۲/۰
Anion cation balance (meq/kg)	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
Dig. Lys	۲۵۸/۱	۲۵۵/۱	۲۵۳/۱	۲۵۰/۱	۲۴۷/۱	۲۴۸/۱
Dig. Met	۶۲۸/۰	۶۲۷۷/۰	۶۲۷۵/۰	۶۲۷۳/۰	۶۲۷۱/۰	۶۲۷/۰
Dig. Met+Cys	۹۳۴/۰	۸۴۴/۰	۷۵۴/۰	۶۶۴/۰	۵۷۴/۰	۹۳/۰
Dig. Thr	۸۴۵۹/۰	۸۴۳۱/۰	۸۴۰۳/۰	۸۳۷۵/۰	۸۳۴۸/۰	۸۳۸۴/۰
Cost	۱۲۴۹	۱۲۳۳	۱۲۰۹	۱۱۸۶	۱۱۶۲	۱۱۵۵

۱. مکمل ویتامینی و معدنی در هر کیلوگرم خواراک، مواد زیر را تامین نمود: ۶۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A، ۴۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D<sub>۳</sub>، ۵۵ واحد بین المللی ویتامین E، ۲/۲ میلی گرم ویتامین K، ۲/۲ میلی گرم ویتامین C، ۴/۵ میلی گرم ویتامین B<sub>۲</sub>، ۴/۵ میلی گرم نیکوتینیک اسید، ۱۵ میلی گرم پنتوتونیک اسید، ۰/۲ میلی گرم ویتامین B<sub>۶</sub>، ۰/۱۶ میلی گرم بیوتین، ۱/۶ میلی گرم فولیک اسید، ۰/۰۱۱ میلی گرم ویتامین B<sub>۱۲</sub>، ۱۵۰۰ میلی گرم کولین کلراید، ۱۲۰ میلی گرم Mn، ۱۱۰ میلی گرم Zn، ۱۶ میلی گرم Cu، ۰/۰۳ میلی گرم Fe، ۰/۱۲۵ میلی گرم d-آسباربیک اسید، ۰/۰۱۱ میلی گرم Biotin، ۰/۰۱۱ میلی گرم Folate، ۰/۰۱۱ میلی گرم Choline chloride، ۰/۰۱۱ میلی گرم Iodine، ۰/۰۱۱ میلی گرم Selenium، ۰/۰۱۱ میلی گرم Copper، ۰/۰۱۱ میلی گرم Zinc، ۰/۰۱۱ میلی گرم Manganese.

1. Vitamin-mineral premix (2.5 kg/1000 kg);vitamin A (9,000 IU), vitamin D2 (4,000IU),vitamin E (55 IU), vitamin K (2.2 g), vitamin B1 (2.2 g),vitamin B2 (5.4 g),nicotinic acid (45 mg), Pantothenic acid (15 mg), vitamin B6 2.2 (2.2 mg), Biotin (0.15 mg), Folate (1.6 mg), vitamin B12 (0.011 mg),Choline chloride (1500 mg), manganese (120 mg), zinc (110 g), copper (16 mg), selenium (0.3 mg), iodine (1 g),iron (20 mg)

2. Nutrient Matrix Value.

جدول ۳. ترکیب مواد خوارکی و مواد مغذی خوارک‌های آزمایشی دوره رشد (۱۱ تا ۲۴ روزگی)

Ingredients	C <sup>+</sup>	%NMV <sup>۲۵</sup>	%NMV <sup>۵۰</sup>	%NMV <sup>۷۵</sup>	%NMV <sup>۱۰۰</sup>	C <sup>-</sup>
Corn grain	۹۷۵۴۸	۲/۵۶۴	۲/۵۸۰	۲/۵۹۶	۲/۶۱۲	۲/۶۱۲
Soybean meal	۸۷۲۷۴	۱/۷۶۸	۳/۳۶۸	۵/۳۵۴	۷/۳۴۷	۷/۳۴۷
Corn oil	۸۳۸	۸۳۰	۷/۲۲	۵/۱۴	۴/۶	۴/۶
Dicalcium phosphate	۱/۱۶	۵/۱۴	۹/۱۲	۳/۱۱	۸/۹	۸/۹
Oyster shell	۸/۸	۱/۹	۳/۹	۶/۹	۸/۹	۸/۹
Common Salt	۵/۳	۳/۳	۱/۳	۹/۲	۸/۲	۸/۲
Sodium bicarbonate	۱	۳/۱	۵/۱	۸/۱	۱/۲	۱/۲
Vitamin and Min. premix <sup>۲</sup>	۵	۵	۵	۵	۵	۵
DL-Methionine	۵/۲	۶/۲	۶/۲	۶/۲	۶/۲	۶/۲
L-Lysine HCl	۵/۰	۵/۰	۶/۰	۸/۰	۱	۱
L-Threonine	۲/۰	۳/۰	۳/۰	۳/۰	۴/۰	۴/۰
Multi enzyme	•	۳/۰	۳/۰	۳/۰	۳/۰	•
Filler	•	•	•	•	•	۳/۰
Sum	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
Nutrients (Calculated as %)						
ME <sub>n</sub> (kcal/kg)	۳۰۰۰	۲۹۶۶	۲۹۲۳	۲۹۰۷	۲۸۶۷	۱۴/۲۸۶۷
Crude protein	۸۰۶/۲۰	۶۴۵/۲۰	۴۸۴/۲۰	۳۲۲/۲۰	۱۶۳/۲۰	۱۶۳/۲۰
Calcium	۸۴۱۹/۰	۸۱۱۹/۰	۷۸۱۹/۰	۷۵۱۹/۰	۷۲۱۹/۰	۷۲۲/۰
Available phosphorus	۴۲۱/۰	۳۹۳/۰	۳۶۵/۰	۳۳۷/۰	۳۰۹/۰	۳۰۹۷/۰
Na	۱۸/۰	۱۸/۰	۱۸/۰	۱۸/۰	۱۸/۰	۱۸/۰
Anion cation balance (meq/kg)	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰
Dig. Lys	۱۱۲۹/۱	۱۱۰۴/۱	۱۰۷۹/۱	۱۰۵۴/۱	۱۰۲۹/۱	۱۰۲۷/۱
Dig. Met	۵۵۳/۰	۵۵۲۷/۰	۵۵۲۵/۰	۵۵۲۳/۰	۵۵۲۱	۵۵۲۰
Dig. Met+Cys	۸۴۱۸/۰	۷۵۱۸/۰	۶۶۱۸/۰	۵۷۱۸/۰	۴۸۱۸/۰	۸۳۸۲/۰
Dig. Thr	۷۹۴۹/۰	۷۴۲۱/۰	۷۳۹۳/۰	۷۳۶۵/۰	۷۳۳۸/۰	۷۳۳۸/۰
Cost	۱۱۹۸	۱۱۱۸	۱۱۵۸	۱۱۳۴	۱۱۱۱	۱۱۰۴

۱. مکمل ویتامینی و معدنی در هر کیلوگرم خوارک، مواد زیر را تامین نمود: ۶۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A، ۴۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D<sub>۳</sub>، ۵۵ واحد بین المللی ویتامین E/۲ میلی گرم ویتامین K/۲ میلی گرم ویتامین B<sub>۱</sub>/۵ میلی گرم ویتامین B<sub>۲</sub>/۵ میلی گرم نیکوتینیک اسید، ۱۵ میلی گرم پنتوئنیک اسید، ۲/۲ میلی گرم ویتامین B<sub>۶</sub>/۰ میلی گرم فولیک اسید، ۱/۶ میلی گرم بیوتین، ۰/۰۰۰ میلی گرم ویتامین B<sub>۱۲</sub>/۰ میلی گرم کولین کلراید، ۱۵۰ میلی گرم Mn/۱۰ میلی گرم Zn/۱۶ میلی گرم Cu/۰ میلی گرم Fe/۰۲۵ میلی گرم A/۱۲۵ میلی گرم D<sub>۳</sub>/۰ میلی گرم

1. Vitamin-mineral premix (2.5 kg/1000 kg):vitamin A (9,000 IU), vitamin D2 (4,000IU),vitamin E (55 IU), vitamin K (2.2 g), vitamin B1 (2.2 g),vitamin B2 (5.4 g),nicotinic acid (45 mg), Pantothenic acid (15 mg), vitamin B6 2.2 (2.2 mg), Biotin (0.15 mg), Folate (1.6 mg), vitamin B12 (0.011 mg).Choline chloride (1500 mg), manganese (120 mg), zinc (110 g), copper (16 mg), selenium (0.3 mg), iodine (1 g),iron (20 mg)  
2. Nutrient Matrix Value.

عملکرد مشابه در جوجه‌های تغذیه‌شده با تیمار دو (۲۵ درصد معادل مواد مغذی آنزیم) نسبت به تیمار کترل مشبت، بیانگر تاثیر مثبت قابل توجه مولتی آنزیم در بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل خوارک است. از مکانیسم‌های احتمالی برای توضیح بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی، می‌توان به کاهش گرانزوی محتويات لوله گوارشی و بهبود انتشار آنزیم‌ها و مواد مغذی (Meng & Slominski, 2005)، بهبود قابلیت هضم انرژی، نیتروژن و نشاسته توسط آنزیم‌های تجزیه کننده (Cowieson & Adeola, 2005, Meng & Slominski, 2005) کاهش ترشحات درون‌زاد (Endogenous) (Cowieson & Adeola, 2005, Meng & Slominski, 2005) محصور شده توسط دیواره سلولی (Cowieson & Adeola, 2005, Ravindran et al., 1999)، تغییر جمعیت میکروبی روده (Annison & Choct, 1991, Sharifi et al., 2013) (Mathlouthi et al., 2002)، تغییر مورفولوژی مخاط روده (Lee et al., 2017) هضم اسید فیتیک توسط فیتات (Cowieson & Adeola, 2005)، هضم بتامانان توسط آنزیم بتامانانز (Odetallah et al., 2004) و تولید الیکوساکاریدهای پری بیوتیکی (jackson et al., 2004) اشاره کرد. نتایج تحقیقات نشان

داده آنژیم‌های کربوهیدرات با تجربه پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای و تولید الیگوساکاریدهای کوچک‌تر، عملکرد پرنده را بهبود می‌دهند (Denehy et al., 2008; Craig et al., 2019; Al-Sultan et al., 2016; Knudsen, 2014; Courtin et al., 2008) و یکی از مکانیسم‌های بهبود مشاهده شده در عملکرد پرنده، خاصیت پری‌بیوتیکی الیگوساکاریدهای تولیدی در نتیجه فعالیت آنژیم‌های کربوهیدرات است. الیگوساکاریدهای حاصل از هیدرولیز پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای توسط باکتری‌های مانند بیفیدوباکتر<sup>۱</sup> و لاکتوپاسیل<sup>۲</sup> تخمیر شده و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را تولید می‌کنند (Lee et al., 2017). با افزایش مقدار اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، جمعیت باکتری‌های بیماری‌زا کاهش (Engberg et al., 2004) و عملکرد رشد پرنده بهبود می‌یابد (Ravangard et al., 2017).

جدول ۴. ترکیب مواد خوارکی و مواد مغذی خوراک‌های آزمایشی دوره پایانی (۲۵ تا ۴۲ روزگی)

Ingredients	Diets					
	C <sup>+</sup>	۲۵%NMV <sup>۲</sup>	۵۰%NMV	۷۵%NMV	۱۰۰%NMV	C <sup>-</sup>
Corn grain	۶۱۸/۶	۶۳۴	۶۵۰	۶۶۴	۶۸۱/۹	۶۸۱/۹
Soybean meal	۳۱۲/۶	۳۰۵/۹	۲۹۹/۱	۲۹۲/۳	۲۸۰/۵	۲۸۰/۵
Corn oil	۳۴/۱	۳۶/۲	۱۸	۹/۹	۱/۷	۱/۷
Dicalcium phosphate	۱۴/۲	۱۲/۶	۱۱	۹/۴	۷/۸	۷/۸
Oyster shell	۸/۱	۸/۴	۸/۷	۸/۹	۹/۲	۹/۲
Common Salt	۲	۱/۸	۱/۶	۱/۴	۱/۲	۱/۲
Sodium bicarbonate	۲/۵	۲/۷	۳	۳/۳	۳/۵	۳/۵
Vitamin and Min. Premix <sup>۱</sup>	۵	۵	۵	۵	۵	۵
DL-Methionine	۲/۲	۲/۲	۲/۳	۲/۳	۲/۳	۲/۳
L-Lysine	۰/۵	۰/۷	۰/۸	۱	۱/۱	۱/۱
L-Threonine	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۳	۰/۳	۰/۳
Multi enzyme	•	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	•
Filler	•	•	•	•	•	۰/۳
Sum	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
Nutrients (Calculated as %)						
ME <sub>n</sub> (kcal/kg)	۳۰۵۰	۳۰۱۶	۲۹۸۳	۲۹۵۰	۲۹۱۷	۲۹۱۷/۱۴
Crude protein (%)	۱۸/۵۸۶	۱۸/۴۲	۱۸/۴۶	۱۸/۰۴	۱۷/۹۴	۱۷/۹۴
Calcium (%)	۰/۷۵۳	۰/۷۲۳	۰/۶۳۳	۰/۶۳۳	۰/۶۳۳	۰/۶۳۳
Available phosphorus (%)	۰/۳۷۶۵	۰/۴۸	۰/۳۲۱	۰/۲۹۳	۰/۲۶۵	۰/۲۶۵
Na (%)	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶
Anion cation balance (meq/kg)	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
Dig. Lys (%)	۰/۹۸۱۷	۰/۹۷۹۲	۰/۹۸۱۲	۰/۹۷۴۲	۰/۹۷۱۷	۰/۹۷۱
Dig. Met (%)	۰/۴۹۶۲	۰/۴۹۵۹	۰/۴۹۵۷	۰/۴۹۵۵	۰/۴۹۵۳	۰/۴۹۵
Dig. Met+Cys (%)	۰/۷۶۲	۰/۶۷۲	۰/۵۸۲	۰/۴۹۲	۰/۴۰۲	۰/۷۵۸
Dig. Thr (%)	۰/۶۵۷۵	۰/۶۵۴۷	۰/۶۵۱۹	۰/۶۴۹۱	۰/۶۴۶۴	۰/۶۴۶۴
Cost	۱۱۴۱	۱۱۲۵	۱۱۰۱	۱۰۷۸	۱۰۵۴	۱۰۴۷

۱. مکمل ویتامینی و معدنی در هر کیلوگرم خوراک، مواد زیر را تامین نمود: ۹۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A<sup>۱</sup> ۴۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D<sub>۳</sub> ۵۵ واحد بین المللی ویتامین E<sup>۲</sup> ۲۰۰ میلی گرم ویتامین K<sup>۳</sup> ۲/۲ میلی گرم ویتامین B<sub>۱</sub> ۵/۴ میلی گرم ویتامین B<sub>۲</sub> ۴۵ میلی گرم نیکوتینیک اسید، ۱۵ میلی گرم پتتوتینیک اسید، ۲/۲ میلی گرم ویتامین B<sub>۶</sub> ۰/۱۵ میلی گرم بیوتین، ۱/۶ میلی گرم فولیک اسید، ۰/۰/۱۱ میلی گرم ویتامین B<sub>۱۲</sub> ۱۵۰ میلی گرم کولین کلراید، ۱۰۰ میلی گرم Mn ۱۱۰ میلی گرم Zn ۱۶ میلی گرم Fe ۰/۳۰ میلی گرم Se ۰/۲۵ میلی گرم I ۰/۰۴۷ میلی گرم

2. Nutrient Matrix Value.

1. Vitamin-mineral premix (2.5 kg/1000 kg);vitamin A (9,000 IU), vitamin D2 (4,000IU),vitamin E (55 IU), vitamin K (2.2 g), vitamin B1 (2.2 g),vitamin B2 (5.4 g),nicotinic acid (45 mg), Pantothenic acid (15 mg), vitamin B6 2.2 (2.2 mg), Biotin (0.15 mg), Folate (1.6 mg), vitamin B12 (0.011 mg),Choline chloride (1500 mg), manganese (120 mg), zinc (110 g), copper (16 mg), selenium (0.3 mg), iodine (1 g),iron (20 mg)

جدول ۵. اثر مواد مغذی معادل مولتی آنزیم سیزده‌گانه حاوی بتا ماناناز بر عملکرد جوجه‌های گوشتشی

Item	C <sup>+</sup>	۲۵%NMV <sup>2</sup>	۵۰%NMV	۷۵%NMV	۱۰۰%NMV	C <sup>-</sup>	SEM	P value
Body weight gain (g)								
۷ day	۱۴۱/۴ <sup>ab</sup>	۱۴۵/۳ <sup>a</sup>	۱۴۴/۵ <sup>ab</sup>	۱۴۳/۵ <sup>ab</sup>	۱۳۸/۷ <sup>ab</sup>	۱۳۱/۹ <sup>b</sup>	۱/۸	.۰۰۰۱
۱۲ day	۲۹۲/۹ <sup>ab</sup>	۲۹۷/۵ <sup>a</sup>	۲۸۹/۳ <sup>ab</sup>	۲۹۱/۲ <sup>ab</sup>	۲۸۳/۸ <sup>b</sup>	۲۸۵/۴ <sup>b</sup>	۳/۱	.۰۰۳
۲۱ day	۵۹۳/۳ <sup>a</sup>	۵۹۷/۳ <sup>a</sup>	۵۷۸/۹ <sup>b</sup>	۵۷۸/۴ <sup>b</sup>	۵۷۰/۷ <sup>b</sup>	۵۷۰/۷ <sup>b</sup>	۴/۸	.۰۰۰۷
۲۸ day	۹۹۷/۲ <sup>a</sup>	۱۰۰/۵ <sup>a</sup>	۹۷۳/۲ <sup>b</sup>	۹۶۷/۳ <sup>b</sup>	۹۶۸/۶ <sup>b</sup>	۹۵۰/۲ <sup>b</sup>	۷/۸	.۰۰۰۳
۳۵ day	۱۵۴۲/۷ <sup>a</sup>	۱۵۲۱/۵ <sup>a</sup>	۱۴۸۷/۷ <sup>b</sup>	۱۴۸۲/۹ <sup>b</sup>	۱۴۸۲/۱ <sup>b</sup>	۱۴۳۹/۷ <sup>c</sup>	۱۱/۲	.۰۰۰۱
۴۲ day	۲۰۵۸/۵ <sup>a</sup>	۲۰۱۶/۲ <sup>ab</sup>	۱۹۸۰/۷ <sup>b</sup>	۱۹۶۲/۶ <sup>b</sup>	۱۹۶۰/۸ <sup>b</sup>	۱۸۷۹/۹ <sup>c</sup>	۱۸/۵	.۰۰۰۱
Feed conversion ratio (g feed/g gain)								
۷ day	.۰/۹۰ <sup>bc</sup>	.۰/۸۹ <sup>bc</sup>	.۰/۳۷ <sup>c</sup>	.۰/۹۰ <sup>bc</sup>	.۰/۹۳ <sup>ab</sup>	.۰/۹۴ <sup>a</sup>	.۰/۰۱	.۰۰۹
۱۲ day	۱/۲۳ <sup>c</sup>	۱/۲۲ <sup>c</sup>	۱/۲۴ <sup>abc</sup>	۱/۲۳ <sup>abc</sup>	۱/۲۷ <sup>a</sup>	۱/۲۶ <sup>ab</sup>	.۰/۰۱	.۰۰۴۵
۲۱ day	۱/۳۳ <sup>b</sup>	۱/۳۲ <sup>b</sup>	۱/۳۵ <sup>ab</sup>	۱/۳۵ <sup>ab</sup>	۱/۳۸ <sup>a</sup>	۱/۳۷ <sup>a</sup>	.۰/۰۱	.۰۰۰۲
۲۸ day	۱/۴۵ <sup>b</sup>	۱/۴۴ <sup>b</sup>	۱/۴۷ <sup>ab</sup>	۱/۴۸ <sup>a</sup>	۱/۵۰ <sup>a</sup>	۱/۴۹ <sup>a</sup>	.۰/۰۱	.۰۰۰۳
۳۵ day	۱/۵۲ <sup>b</sup>	۱/۵۴ <sup>b</sup>	۱/۵۹ <sup>a</sup>	۱/۵۸ <sup>a</sup>	۱/۶۰ <sup>a</sup>	۱/۶۲ <sup>a</sup>	.۰/۰۱	.۰۰۰۱
۴۲ day	۱/۶۱ <sup>b</sup>	۱/۶۴ <sup>b</sup>	۱/۶۹ <sup>a</sup>	۱/۶۹ <sup>a</sup>	۱/۷۱ <sup>a</sup>	۱/۷۴ <sup>a</sup>	.۰/۰۱	.۰۰۰۱

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار ( $P < 0.05$ ) است.C<sup>+</sup>; Positive control, C<sup>-</sup>; Negative control, Means with different superscripts on same row differ significantly ( $P < 0.05$ ).

2. Nutrient Matrix Value.

نتایج بیانگر این است که در تیمار ۲۵ (محاسبه ۲۵ درصد مواد مغذی معادل آنزیم) علی‌رغم کاهش ۳۳ کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز، ۰/۱۶ واحد پروتئین خام و ۰/۰۳ واحد فسفر قابل دسترس، با افزودن آنزیم، عملکرد نسبت به کنترل مثبت تغییر نکرده است. اما با کاهش مقدار انرژی قابل سوخت و ساز، پروتئین خام و فسفر قابل دسترس در مقدادر بالاتر، افزودن آنزیم نتوانست عملکرد پرنده را در سطح طبیعی حفظ کند و علت آن می‌تواند بالاتر بودن مقدادر برآورد شده معادل مواد مغذی آنزیم باشد.

تأثیر مولتی آنزیم بر میزان پروتئین، کلسیم و فسفر موجود در فضولات در سن ۴۲ روزگی، در جدول ۶ آورده شده است. افزودن مولتی آنزیم به جیره تأثیر معنی‌داری بر میزان دفع کلسیم از طریق فضولات نداشت. این در حالی است که افزودن آنزیم موجب کاهش دفع از طریق فضولات شد. به طوری که پروتئین فضولات در تیمارهای چهار (محاسبه ۷۵ درصد مواد مغذی معادل آنزیم)، پنجم (محاسبه ۱۰۰ درصد مواد مغذی معادل آنزیم) و شش (کنترل منفی) نسبت به تیمار کنترل مثبت کاهش قابل توجهی داشت ( $P < 0.04$ ). در حالی که کاهش درصد پروتئین فضولات در تیمار دو (محاسبه ۲۵ درصد مواد مغذی معادل آنزیم) و سه (محاسبه ۵۰ درصد مواد مغذی معادل آنزیم)، نسبت به تیمار کنترل مثبت معنی‌دار نبود. دفع فسفر از طریق فضولات در تیمار پنجم (محاسبه ۲۵ درصد مواد مغذی معادل آنزیم) و شش (کنترل منفی)، کاهش قابل توجهی در مقایسه با تیمار کنترل مثبت داشت ( $P < 0.01$ ). اما کاهش دفع فسفر در تیمارهای دو، سه و چهار نسبت به تیمار کنترل مثبت معنی‌دار نبود.

براساس نتایج به دست آمده، دفع فسفر در جوجه‌هایی که آنزیم مصرف نموده بودند ۳/۶ درصد نسبت به دو گروه دیگر که آنزیم مصرف ننموده بودند (گروه کنترل مثبت و منفی) کمتر بود که حاکی از جذب بیشتر فسفر از دستگاه گوارش است. مصرف مولتی آنزیم و اعمال ماتریس آنزیم در فرمولاسیون جیره، موجب کاهش قابل توجه دفع فسفر و از طریق فضولات شد. مکانیسم احتمالی دخیل در کاهش فسفر و پروتئین خام دفعی از طریق فضولات می‌تواند به این صورت باشد که کاهش سطح فسفر (Selle et al., 2012)، کلسیم و پروتئین جیره، با اعمال ماتریس مولتی آنزیم در فرموله کردن جیره، از تیمار یک

تا تیمار شش از یک سو و افزایش دسترسی و ابقاء پروتئین، کلسیم و فسفر باند شده با فیتات به دلیل حضور مولتی آنزیم (Yi et al., 1996) از سوی دیگر می‌تواند موجب کاهش دفع فسفر (Plumstead et al., 2008, Selle et al., 2012, Yi et al., 2001, Yan et al., 2001) و افزودن فیتاز (Selle et al., 2012) باشد. به طوری که طبق گزارش، کاهش سطح فسفر جیره در جیره موجب کاهش دفع فسفر در خوک و جوجه گوشتی به ترتیب ۳۵ و ۴۷٪ شد (Yi et al., 1996).

**جدول ۶. اثر مواد مغذی معادل مولتی آنزیم سیزده گانه حاوی بنا ماناناز بر میزان دفع کلسیم، فسفر و ازت از طریق فضولات (بر حسب ماده خشک)**

P (%)	Ca (%)	Protein (%)	Treatment
۱/۰۷ <sup>a</sup>	۲/۵۸	۲۵/۷۴ <sup>a</sup>	C <sup>+</sup> (کنترل مثبت)
۱/۱۳ <sup>a</sup>	۲/۳۷	۲۵/۶۱ <sup>ab</sup>	مواد مغذی معادل آنزیم ۲۵٪
۰/۹۸ <sup>ab</sup>	۲/۶۵	۲۳/۷۳ <sup>abc</sup>	مواد مغذی معادل آنزیم ۵۰٪
۱/۰۱ <sup>ab</sup>	۲/۶۳	۲۲/۶۵ <sup>bc</sup>	مواد مغذی معادل آنزیم ۷۵٪
۰/۰۸ <sup>b</sup>	۲/۳۶	۲۲/۵۱ <sup>c</sup>	مواد مغذی معادل آنزیم ۱۰۰٪
۰/۷۸ <sup>b</sup>	۲/۲۸	۲۲/۰۸ <sup>c</sup>	C <sup>-</sup> (کنترل منفی)
۰/۰۳	۰/۰۶	۰/۴۶	SEM
۰/۰۱	۰/۵۵	۰/۰۴	P Value

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار ( $P < 0.05$ ) است.

Means with different superscripts on same column differ significantly ( $P < 0.05$ ).

افزودن مولتی آنزیم به خوراک و محاسبه ۲۵ درصد از مواد مغذی معادل آنزیم موجب ارزان تر شدن خوراک به میزان ۱۶۰ ریال شد (جدول های ۲، ۳ و ۴). با توجه به اینکه تفاوت عملکرد تیمار ۱ و ۲ معنی دار نبود با احتساب هزینه خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن ( $۱/۶۴ \times ۱۶۰ = ۲۶۲/۴$ ) و هزینه افزودن آنزیم به خوراک ( $۱۱۵/۶ \times ۲۳۵۰۰۰ = ۳۰۰۰/۰۰۰۳$ ) نسبت هزینه به فایده (Return On Investment=ROI) ۲/۲۶ خواهد شد.

#### ۴. نتیجه گیری کلی

بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از مولتی آنزیم حاوی بنا ماناناز با در نظر گرفتن ۲۵ درصد معادل مواد مغذی آنزیم، عملکرد پرنده را در مقایسه با جیره فاقد آنزیم تحت تاثیر قرار نداد و با توجه به ارزان تر بودن خوراک دارای آنزیم با احتساب ۲۵ درصد معادل مواد مغذی استفاده از آنزیم در جیره هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عملکردی دارای اهمیت بوده و استفاده از آن توصیه می شود.

#### ۵. تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافعی بین نویسنده‌گان وجود ندارد.

#### ۶. منابع

- Al-Sultan, S., Abdel-Raheem, S.M., El-Ghareeb, W.R., & Mohamed, M.H.A. (2016). Comparative effects of using prebiotic, probiotic, symbiotic and acidifier on growth performance, intestinal microbiology and histomorphology of broiler chicks. *Japanese Journal of Veterinary Research*, 64 (Supplement 2), S187-S195.

- Annison, G., & Choct, M. (1991). Anti-nutritive activities of cereal non-starch polysaccharides in broiler diets and strategies minimizing their effects. *World's Poultry Science Journal*, 47, 232-242.
- Bedford, M.R. (2018). The evolution and application of enzymes in the animal feed industry: the role of data interpretation. *British Poultry Science*, 59, 486-493.
- Berwanger, E., Nunes, R.V., Olivera, T.M.M DE., Bayerle, D.F., & Bruno, L.D.G. (2017). Performance and carcass yield of broiler fed increasing levels of sunflower cake. *Revista Caatinga*, 30(1), 201-212
- Courtin, C.M., Broekaert, W.F., Swennen, K., Lescort, O., Onagbesan, O., Buyse, J., & Decypere, E. (2008). Dietary inclusion of wheat bran arabinohydroxyoligosaccharides induces beneficial nutritional effects in chickens. *Cereal Chemistry*, 85, 607-613.
- Cowen, E.L., Wyman, P.A., & WORK, W.C. (1996). Resilience in highly stressed urban children: Concepts and findings. *Psicologia Escolar e Educacional*, 73(2)267-84.
- Cowieson, A., & Adeola, O. (2005). Carbohydrases, protease, and phytase have an additive beneficial effect in nutritionally marginal diets for broiler chicks. *Poultry Science*, 84, 1860-1867.
- Cowieson, A.J., Bedford, M.R., Selle, P.H., & Ravindran, V. (2009). Phytate and microbial phytase: implications for endogenous nitrogen losses and nutrient availability. *Worlds Poultry Science Journal*, 65, 401-417.
- Cowieson, A.J., & Bedford, M.R. (2009). The effect of phytase and carbohydrase on ileal amino acid digestibility in monogastric diets: complimentary mode of action? *Worlds Poultry Science Journal*, 65, 609-624.
- Cowieson, A.J., Bedford, M.R., & Ravindran, V. (2010). Interactions between xylanase and glucanase in maize-soy-based diets for broilers. *British Poultry Science*, 51, 246-257.
- Craig, A.D., Khattak, F., Hastie, P., Bedford, M.R., & Olukosi, O.A. (2019). Xylanase and xylo-oligosaccharide prebiotic improve the growth performance and concentration of potentially prebiotic oligosaccharides in the ileum of broiler chickens. *British Poultry Science*, 61(1), 70-78.
- Engberg, R.M., Hedenann, M.S., Steenfekdt, S., & Jensen, B.B. (2004). Influence of whole wheat and xylanase on broiler performance and microbial composition and activity in the digestive tract. *Poultry Science*, 82, 925-938.
- Jackson, M., Fodge, D., & Hsiao, H. (1999). Effects of beta-mannanase in corn-soybean meal diets on laying hen performance. *Poultry Science*, 78, 1737-1741.
- Jackson, M., Geronian, E. K., Knox, A., McNab, J., & McCartney, E. (2004). A dose-response study with the feed enzyme  $\beta$ -Mannanase in broilers provided with corn-soybean meal based diets in the absence of antibiotic growth promoters. *Poultry Science*, 83, 1992-1990.
- KNUDSEN, K.E.B. (2014). Fibre and Non-Starch Polysaccharide Content and Variation in Common Crops Used in Broiler Diets. *Poultry Science*, 93, 2380-2393.
- Lee, S.A., Apajalahti, J., Vienola, K., Gonzalez-Ortiz, G., Fontes, C.M.G.A., & Bedford, M.R. (2017). Age and dietary xylanase supplementation affects ileal sugar residues and short chain fatty acid concentration in the ileum and caecum of broiler chickens. *Journal of Animal Feed Science and Technology*, 234, 29-42.
- Mathlouthi, N., Mallet, S., Saulnier, L., Quemener, B., & Larbier, M. (2002). Effects of xylanase and  $\beta$ -glucanase addition on performance, nutrient digestibility, and physico-chemical conditions in the small intestine contents and caecal microflora of broiler chickens fed a wheat and barley-based diet. *Animal Research*, 51, 395-406.
- Meng, X., & Slominski, B. (2005). Nutritive values of corn, soybean meal, canola meal, and peas for broiler chickens as affected by a multicarbohydrase preparation of cell wall degrading enzymes. *Poultry Science*, 84, 1242-1251.

- Odetallah, N.H., Ferket, P.R., Grimes, J.L., & McNaughton, J.L. (2002). Effect of mannan-endo-1,4-beta-mannosidase on the growth performance of turkeys fed diets containing 44 and 48% crude protein soybean meal. *Poultry Science*, 81, 1322-1331.
- Rosen, G. D. (2001). The Nutritive value of phytase. *Proceedings of the 13th European Symposium on Poultry Nutrition*, 30 Sept-4 Oct. World's Poultry Science Association, Beekbergen, the Netherlands, 215-216.
- Rosen, G. D. (2002). Exogenous enzymes as pronutrients in broiler diets. In P. C. Garnsworthy, J. Wiseman, eds. *Recent Advances in Animal Nutrition*. Pp 89-104, Nottingham University Press, Nottingham, UK.
- Pirgozliev, V.R., Bedford, M.R., Acamovic, T., Mares, P., & Allymehr, M. (2011). The effects of supplementary bacterial phytase on dietary energy and total tract amino acid digestibility when fed to young chickens. *British Poultry Science*, 52, 245-254.
- Plumstead, P., Leytem, A., Maguire, R., Spears, J., Kwanyuen, P., & Brake, J. (2008). Interaction of calcium and phytate in broiler diets. 1. Effects on apparent prececal digestibility and retention of phosphorus. *Poultry Science*, 87, 449-458.
- Ravangard, A. H., Houshmand, M., Khajvi, M. and Naghihi, R. (2017). Performance and cecal bacteria counts of broilers fed low protein diets with and without a combination of probiotic and prebiotic. *Brazilian Journal of Poultry Science*, no. Special Issue–Nutrition: 75-82.
- Ravn, J.L., Martens, H.J., Pettersson, D., & Pedersen, N.R. (2016). A commercial GH 11 xylanase mediates xylanases solubilisation and degradation in wheat, rye, and barley as demonstrated by microscopy techniques and wet chemistry methods. *Animal Feed Science and Technology*, 219, 216-225.
- Ravindran, V., Cabahug, S., Ravindran, G., & Bryden, W. L. (1999). Influence of microbial phytase on apparent ileal amino acid digestibility in feedstuffs for broilers. *Poultry Science*, 78, 699-706.
- Ravindran, V., Selle, P. H., Ravindran, G., Morel, P. C. H., Kies, A. K., & Bryden, W. L. (2001). Microbial phytase improves performance, apparent metabolizable energy and amino acid digestibility of broilers fed a lysine-deficient diet. *Poultry Science*, 80, 338-344.
- SAS Institute. (1990). *SAT/STAT\_ User's Guide: Statistics*. Release 6.04. SAS Institute, Inc., Cary, NC.
- Selle, P. H., Cowieson, A. J., Cowieson, N. P., & Ravindran, V. (2012). Protein-phytate interactions in pig and poultry nutrition: a reappraisal. *Nutrition Research Reviews*, 251.
- Sharifi, M., Bay, C., Skrocki, L., Rahimi, F., & Mehdipour, K. (2013). Moderate pulmonary embolism treated with thrombolysis (from the "MOPETT" Trial). *American Journal of Cardiology*, 15, 111(2), 273-7.
- Siriwan, P., Bryden, W. L., Mollah, Y., & Annison, E. F. (1993). Measurement of endogenous amino acid losses in poultry. *British Poultry Science*, 34, 939-949.
- Yi, Z., Kornegay, E. T., Ravindran, V., & Denbow, D. M. (1996). Improving phytate phosphorus availability in corn and soybean meal for broiler using microbial phytase and calculation of phosphorus equivalency values for phytase. *Poultry Science*, 75, 240-249.
- Yan, F., Kersey, J., & Waldroup, P. (2001). Phosphorus requirements of broiler chicks three to six weeks of age as influenced by phytase supplementation. *Poultry Science*, 80, 455-459.
- Zaghari, M., Majdeddin, M., Taherkhani, R., & Moravej, H. (2008). Estimation of nutrient equivalency values of natuzyme and its effects on broiler chick performance. *The Journal of Applied Poultry Research*, 17, 446-453.